

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К. А. Савенков
30 июля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Фиприст® Спот Он

(организация-разработчик АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста
6, 8501 Ново место, Словения / «KRKA, d.d., Novo mesto»,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija)

Номер регистрационного удостоверения 705-3-14.15-3012№ПВИ-3-8.0/03272

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фиприст® Спот Он (Fupryst® Spot On).

Международное непатентованное наименование: фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Фиприст® Спот Он в качестве действующего вещества содержит фипронил – 100 мг в 1 мл, а в качестве вспомогательных веществ - повидон, полисорбат, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол и диметилсульфоксид.

3. По внешнему виду Фиприст® Спот Он представляет собой жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают Фиприст® Спот Он расфасованным по 0,5; 0,67; 1,34; 2,68; 4,02 мл в полипропиленовые пипетки, помещенные поштучно в пакеты из алюминиевой фольги. Пипетки упаковывают в картонные пачки по три штуки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Фиприст® Спот Он следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. При уничтожении неиспользованного препарата не следует допускать его попадания в природные водоемы и источники питьевой воды.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фиприст® Спот Он – инсектоакарицидный лекарственный препарат контактного действия.

10. Фиприст® Спот Он активен в отношении:

- половозрелых фаз развития блох *Ctenocephalides* spp.;
- власоедов *Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*;
- иксодовых клещей (все фазы развития) *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes* spp., *Haemaphysalis* spp.;
- вшей *Linognathus setosus*;
- саркоптоидных клещей *Sarcoptes scabiei* var. *canis*;
- комаров *Aedes aegypti*;
- ушных клещей *Otodectes cynotis*.

Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожу фипронил в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывая длительное контактное инсектоакарицидное действие, обеспечивает защиту животного от эктопаразитов. Однократная обработка животного обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 и 48 часов соответственно.

Фиприст® Спот Он по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Фиприст® Спот Он назначают собакам и кошкам с 8-недельного возраста при энтомозах, отодектозе, поражении клещами (иксодовыми, хейлителлами), а также в комплексной терапии аллергического дерматита, вызываемого блохами.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ингредиентам препарата (в том числе в анамнезе). Запрещается применение препарата Фиприст® Спот Он больным инфекционными болезнями и ослабленным животным, собакам массой менее 2 кг, кошкам массой менее 1 кг.

Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки.

13. При работе с препаратом Фиприст® Спот Он следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается

курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. В течение 24 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Людям с гиперчувствительностью к фипронилу следует избегать прямого контакта с препаратом.

Пустая упаковка из-под препарата подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат разрешается применять животным, предназначенным для разведения, а также беременным и лактирующим самкам. Запрещается применение препарата Фиприст® Спот Он щенкам и котятм моложе 8-недельного возраста.

15. Фиприст® Спот Он применяют животным путем однократного топикального нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки (в зависимости от вида и массы животного).

Перед применением препарат необходимо выдержать при комнатной температуре (выше 14 °С) около 1 часа. Кончик пипетки прокалывают перевернутым колпачком, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в одну или несколько точек в следующих дозах:

Вид животного, масса (кг)	Объем используемой пипетки (мл)/содержание фипронила (мг)	Количество пипеток
Собаки:		
2-10	0,67/67	1
10-20	1,34/134	1
20-40	2,68/268	1
40-60	4,02/402	1
Кошки	0,5/50	1

При обработке собак массой более 60 кг используют комбинацию пипеток разного объема. При обработке кошек массой более 10 кг используют 2 пипетки объемом 0,5 мл.

Продолжительность защитного действия препарата против иксодовых клещей после обработки кошек составляет до 4 недель, после обработки собак – до 5 недель; продолжительность защитного действия против блох

после обработки кошек – до 5 недель, после обработки собак от 4 до 12 недель.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в четыре недели.

В целях предотвращения повторной инфекации животных блохами рекомендуется обрабатывать всех кошек и собак, обитающих совместно, а также заменить подстилки или обработать их инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению. Для лечения отодектоза Фиприст® Спот Он закапывают в каждое ухо по 4-6 капель (капли обязательно вводят в оба уха). Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на массу животного), наносят на кожу между лопаток (однократная обработка).

При осложнении отодектоза отитом назначают противомикробные и противовоспалительные средства.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. Очень редко на месте нанесения препарата возможно склеивание шерсти, слабо выраженная реакция кожи (зуд, выпадение шерсти, покраснение кожи). При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с мылом или зоошампунем и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

17. При значительной передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

18. Фиприст® Спот Он не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

21. Фиприст® Спот Он не предназначен для обработки продуктивных животных.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя препарата

1. «KRKA, d.d., Novo mesto»,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo
mesto, Slovenija
2. «KRKA, d.d., Novo mesto»,
Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto,

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

Slovenija
ООО «КРКА-РУС», 125212,
г. Москва, Головинское шоссе,
дом 5, корпус 1
тел.: +7(495) 981-10-95,
факс: +7(495) 981-10-91